

Questionnaire sur l'enseignement des soins en périnatalité 2017-2018
CUMF Les AURORES-BOREALES (La SARRE)

Taux de réponse : $\frac{3}{4} = 75 \%$

Veillez identifier votre milieu:

| # | Réponse | % | Compte |
|---|--------------|---------|--------|
| 1 | UMF La Sarre | 100.00% | 3 |
| | Total | 100% | 3 |

Q1 - Au cours de votre résidence, estimez-vous avoir prodigué des soins à un nombre suffisant de patientes enceintes pour en assumer le suivi?

| # | Réponse | % | Compte |
|---|---------|---------|--------|
| 1 | OUI | 100.00% | 3 |
| 2 | NON | 0.00% | 0 |
| | Total | 100% | 3 |

Q2 - Au cours de votre résidence : (Indiquer en nombre)

| Combien avez-vous suivi de grossesses à la CUMF? | Combien avez-vous fait d'accouchements? |
|--|---|
| 3 | 0 |
| 3 | 30 |
| 6 | 6 a umf et nombreuse obstétrique |

Q2a - Au cours de votre résidence :

| # | Question | OUI | NON | Total | |
|---|--|---------|-----|-------|---|
| 2 | Avez-vous été exposé au triage de la salle d'accouchement? | 100.00% | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Avez-vous été exposé à la pouponnière? | 100.00% | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Avez-vous été exposé au post-partum? | 100.00% | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Avez-vous été exposé à des patientes ayant des problématiques d'allaitement? | 100.00% | 3 | 0 | 3 |

Q3 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes en période de préconception en regard des compétences suivantes :

| # | Question | Je maîtrise très bien | Je maîtrise bien | Je maîtrise peu | Je ne maîtrise pas | Total | | | | |
|---|--|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------|---|-------|---|---|
| 1 | Promouvoir de saines habitudes de vie chez le couple qui désire concevoir | 66.67% | 2 | 33.33% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Guider les couples sur les méthodes de dépistage prénatal | 33.33% | 1 | 66.67% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 3 |
| 3 | Évaluer et prévenir les risques d'anomalies du tube neural | 66.67% | 2 | 33.33% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 3 |
| 4 | Questionner les causes de l'infertilité et amorcer l'investigation de base | 66.67% | 2 | 0.00% | 0 | 33.33% | 1 | 0.00% | 0 | 3 |

Q4 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant leur grossesse en regard des compétences suivantes :

| # | Question | Je maîtrise très bien | Je maîtrise bien | Je maîtrise peu | Je ne maîtrise pas | Total | | | | |
|---|--|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------|---|-------|---|---|
| 1 | Procéder à une évaluation complète et appropriée au 1er trimestre | 66.67% | 2 | 33.33% | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 |
| 2 | Procéder à une évaluation complète et appropriée au 2e trimestre | 66.67% | 2 | 33.33% | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 |
| 3 | Procéder à une évaluation complète et appropriée au 3e trimestre | 0.00% | 0 | 100.00% | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 |
| 4 | Recommander les méthodes de détection des anomalies génétiques au besoin (amniocentèse / biopsie | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 0.00% | 0 | 3 |

| | chorionique) | | | | | | | | | |
|----|---|--------|---|---------|---|--------|---|-------|---|---|
| 5 | Connaître des outils et ressources sur la gestion des médicaments durant la grossesse | 66.67% | 2 | 33.33% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 3 |
| 6 | Gérer les symptômes digestifs de la grossesse non compliquée | 33.33% | 1 | 66.67% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 3 |
| 7 | Gérer les contacts infectieux de la grossesse non compliquée | 33.33% | 1 | 66.67% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 3 |
| 8 | Reconnaître les signes et symptômes d'une cholestase de grossesse | 33.33% | 1 | 66.67% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 3 |
| 20 | Gérer les éruptions cutanées de la grossesse non compliquée | 33.33% | 1 | 0.00% | 0 | 66.67% | 2 | 0.00% | 0 | 3 |
| 9 | Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'une hypothyroïdie | 33.33% | 1 | 66.67% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 3 |
| 10 | Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'un diabète gestationnel | 66.67% | 2 | 33.33% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 3 |
| 11 | Reconnaître et gérer les patientes présentant des signes et symptômes d'une pré-éclampsie | 66.67% | 2 | 33.33% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 3 |
| 12 | Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'une anémie ferriprive | 33.33% | 1 | 66.67% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 3 |
| 13 | Gérer les risques reliés au travail d'une grossesse non compliquée | 33.33% | 1 | 66.67% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 3 |
| 14 | Faire une demande de retrait préventif si nécessaire | 33.33% | 1 | 66.67% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 3 |
| 15 | Gérer les saignements utérins de la grossesse non compliquée au 1er trimestre | 33.33% | 1 | 66.67% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 3 |
| 16 | Gérer les saignements utérins de la grossesse non compliquée au 3e trimestre | 0.00% | 0 | 100.00% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 3 |
| 17 | Évaluer le bien-être foetal | 33.33% | 1 | 66.67% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 3 |
| 18 | Reconnaître et référer au besoin les conditions médicales spécifiques à une grossesse à risque | 33.33% | 1 | 66.67% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 3 |
| 19 | Reconnaître et référer au besoin les conditions psychosociales spécifiques à une grossesse à risque | 33.33% | 1 | 66.67% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 3 |

Q5 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant la période intrapartum en regard des compétences suivantes :

| # | Question | Je maîtrise très bien | | Je maîtrise bien | | Je maîtrise peu | | Je ne maîtrise pas | | Total |
|---|---|-----------------------|---|------------------|---|-----------------|---|--------------------|---|-------|
| 1 | Superviser le déroulement du travail dans ses différentes phases | 0.00% | 0 | 100.00% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 3 |
| 2 | Assurer la surveillance foetale par monitoring externe et interne | 0.00% | 0 | 100.00% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 3 |
| 3 | Interpréter et gérer un tracé anormal | 33.33% | 1 | 66.67% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 3 |
| 4 | Induire le travail à terme | 0.00% | 0 | 33.33% | 1 | 66.67% | 2 | 0.00% | 0 | 3 |
| 5 | Soulager la douleur durant le travail | 33.33% | 1 | 66.67% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 3 |
| 6 | Remédier à l'arrêt de progression durant le travail | 0.00% | 0 | 33.33% | 1 | 66.67% | 2 | 0.00% | 0 | 3 |
| 7 | Reconnaître et initier les manoeuvres d'une dystocie des épaules | 0.00% | 0 | 66.67% | 2 | 33.33% | 1 | 0.00% | 0 | 3 |

Q6 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant la période postpartum en regard des compétences suivantes :

| # | Question | Je maîtrise très bien | | Je maîtrise bien | | Je maîtrise peu | | Je ne maîtrise pas | | Total |
|---|--|-----------------------|---|------------------|---|-----------------|---|--------------------|---|-------|
| 1 | Offrir des conseils post-partum au niveau de la contraception | 66.67% | 2 | 33.33% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 3 |
| 2 | Reconnaître et gérer les hémorragies | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 0.00% | 0 | 3 |
| 3 | Reconnaître et gérer les fièvres puerpérales et les infections pelviennes | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 0.00% | 0 | 3 |
| 4 | Reconnaître et gérer les « blues » du postpartum | 33.33% | 1 | 66.67% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 3 |
| 5 | Reconnaître et gérer la dépression postpartum | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 0.00% | 0 | 3 |
| 6 | Reconnaître et soutenir les mères qui présentent des problèmes courants de l'allaitement | 33.33% | 1 | 66.67% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 3 |

Q7 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre les problèmes de néonatalogie en regard des compétences suivantes :

| # | Question | Je maîtrise très bien | | Je maîtrise bien | | Je maîtrise peu | | Je ne maîtrise pas | | Total |
|---|---|-----------------------|---|------------------|---|-----------------|---|--------------------|---|-------|
| 1 | Savoir procéder à l'examen initial du nouveau-né | 33.33% | 1 | 66.67% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 3 |
| 2 | Savoir reconnaître les anomalies les plus fréquentes chez le nouveau-né | 33.33% | 1 | 66.67% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 3 |
| 3 | Reconnaître et gérer l'hyperbilirubinémie | 33.33% | 1 | 66.67% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 3 |
| 5 | Reconnaître et référer au besoin l'asphyxie et la tachypnée | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 0.00% | 0 | 3 |
| 6 | Reconnaître et gérer les dysplasies de la hanche | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 0.00% | 0 | 3 |

Q8 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à poser les gestes techniques suivants :

| # | Question | Je maîtrise très bien | | Je maîtrise bien | | Je maîtrise peu | | Je ne maîtrise pas | | Total |
|---|---|-----------------------|---|------------------|---|-----------------|---|--------------------|---|-------|
| 1 | Déterminer la dilatation et l'effacement du col et la position du fœtus | 33.33% | 1 | 66.67% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 3 |
| 2 | Effectuer une rupture artificielle des membranes | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 0.00% | 0 | 3 |
| 5 | Effectuer un accouchement vaginal se présentant par le vertex | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 0.00% | 0 | 3 |
| 6 | Réparer une épisiotomie et/ou lacération simple vulvaire, vaginale et/ou périnéale du 1er degré | 33.33% | 1 | 66.67% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 3 |
| 3 | Réparer une épisiotomie et/ou lacération simple vulvaire, vaginale et/ou périnéale du 2e degré | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 0.00% | 0 | 3 |
| 7 | Effectuer un massage bi-manuel | 33.33% | 1 | 66.67% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 3 |

Q9 - Connaissez-vous les ressources communautaires pour soutenir les femmes enceintes?

| # | Réponse | % | Compte |
|---|-------------------|--------|--------|
| 1 | Oui, suffisamment | 66.67% | 2 |
| 2 | Pas assez | 33.33% | 1 |
| 3 | Non | 0.00% | 0 |
| | Total | 100% | 3 |

Q10 - Connaissez-vous les ressources communautaires pour soutenir les femmes en période post-partum?

| # | Réponse | % | Compte |
|---|-------------------|--------|--------|
| 1 | Oui, suffisamment | 66.67% | 2 |
| 2 | Pas assez | 33.33% | 1 |
| 3 | Non | 0.00% | 0 |
| | Total | 100% | 3 |

Q11 - Quelle est votre appréciation de votre formation en périnatalité?

| # | Réponse | % | Compte |
|---|-------------------|--------|--------|
| 1 | Très satisfaisant | 33.33% | 1 |
| 2 | Satisfaisant | 66.67% | 2 |
| 3 | Peu satisfaisant | 0.00% | 0 |
| 4 | Insatisfaisant | 0.00% | 0 |
| | Total | 100% | 3 |

Q12 - Prévoyez-vous suivre des femmes enceintes dans votre pratique (délai maximal de 3 ans)?

| # | Réponse | % | Compte |
|---|-----------------------|--------|--------|
| 1 | Oui | 0.00% | 0 |
| 2 | Non | 33.33% | 1 |
| 3 | Je ne sais pas encore | 66.67% | 2 |
| | Total | 100% | 3 |

Q13 - Prévoyez-vous travailler à la salle d'accouchement dans votre pratique (délai maximal de 3 ans)?

| # | Réponse | % | Compte |
|---|-----------------------|---------|--------|
| 1 | Oui | 0.00% | 0 |
| 2 | Non | 100.00% | 3 |
| 3 | Je ne sais pas encore | 0.00% | 0 |
| | Total | 100% | 3 |

Q14 - Veuillez identifier 3 points forts de votre résidence dans votre formation en périnatalité

| Point no 1 | Point no 2 | Point no 3 |
|---|--|--|
| Bonne exposition à HMR | Cours GESTA | |
| suivi des grossesses au bureau et en postpartum | reparer les lacérations postaccouchement | prise en charge des symptomes aigues à l'urgence |
| bonne exposition | suivi grossesse bien encadrée | stage d obstétrique tres pertinent |

Q15 - Si vous aviez 3 améliorations à apporter dans votre formation en périnatalité que feriez-vous en priorité?

| Priorité no 1 | Priorité no 2 | Priorité no 3 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Selon moi formation non nécessaire pour un médecin qui ne veut pas faire d'obstetrique | Je ne ferai pas d'obstétrique | Je ne ferai pas d'obstetrique |
| gérer une dystocie de l'épaule | utiliser un forceps au PRN | |