

 **Vaccin DCaT** **Vaccin D2T5**

La personne qui reçoit ce vaccin se protège contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche (DcaT seulement) et leurs complications.

La **diphtérie** est une maladie infectieuse contagieuse très rare.

Elle cause :

- Maux de gorge important
- Forte fièvre
- Problèmes respiratoires et cardiaques

Le **tétanos** est une maladie infectieuse grave qui peut survenir après toute blessure, même légère, avec une plaie contaminée (morsure d'animal, clou rouillé, brûlure, simple égratignure, etc.).

Elle cause :

- Spasmes musculaires

La **coqueluche** est une infection fortement contagieuse des voies respiratoires causée par une bactérie.

Elle cause :

- Toux aboyante
- Quinte de toux avec vomissements

Réactions possibles au vaccin :

- Douleur, rougeur, gonflement au site d'injection.
- Une petite bosse au site de l'injection pouvant durer plusieurs semaines.
- Fièvre
- Douleur et faiblesse dans le bras pouvant durer plusieurs semaines.

Ce qu'il faut faire :

- Appliquer une compresse humide froide au site de l'injection.
- Prendre un médicament du type acétaminophène ou ibuprofène si la température est supérieure à 38.5° ou pour soulager la douleur.

Comme pour tout médicament ou produit biologique, une réaction allergique reste possible. Si une réaction allergique grave devait survenir, elle débiterait dans les minutes qui suivent. Par conséquent, il est recommandé de demeurer sur place au moins **15 minutes** après l'administration du vaccin.

Il est recommandé de recevoir une dose de rappel du vaccin tous les **10 ANS** pour avoir la meilleure protection possible.

**Pour des informations complémentaires sur votre état de santé,
veuillez rejoindre une infirmière à l'Info-Santé en composant le 811.**